

In Notfällen oder bei Fragen zu Behandlungen, die möglicherweise mit HEMGENIX® interagieren, nutzen Sie bitte die folgenden Kontaktinformationen

Name des Arztes/der Ärztin für Hämophilie	
Telefonnummer/ E-Mail-Adresse	
Institution	
Name des Arztes/der Ärztin für Gentherapie (falls abweichend)	
Telefonnummer/ E-Mail-Adresse	
Institution	
Notfallkontakt (Partner/in des Patienten/ Geschwister/ sonstige)	

©2023 CSL Behring GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, Deutschland
Version: 1.0. 19-Dez-22 – Genehmigt vom Paul-Ehrlich-Institut, Langen

Patientenkarte

HEMGENIX®

(▼Etranacogen dezaparvovec)



Name des Patienten:

Datum der Behandlung mit HEMGENIX®: TT / MM / JJJJ

Tragen Sie diese Karte nach der Behandlung mit HEMGENIX® jederzeit bei sich und zeigen Sie sie bei jeder medizinischen Behandlung dem medizinischen Betreuungspersonal (Ärztin / Arzt oder Pflegepersonal).

Patienteninformationen

- Achten Sie darauf, sich regelmäßig nach ärztlicher Anweisung Bluttests und Untersuchungen zu unterziehen.
- Suchen Sie bitte bei Symptomen, die auf eine Thrombose oder Embolie (thromboembolisches Ereignis) hinweisen, wie plötzliche Brustschmerzen, Kurzatmigkeit, plötzliches Einsetzen von Muskelschwäche, Gefühlsverlust und/oder Gleichgewichtsstörungen, verminderte Aufmerksamkeit, Schwierigkeiten beim Sprechen oder Schwellung eines oder beider Beine, unverzüglich einen Arzt/Ärztin auf.
- **Spenden Sie weder Blut, noch Samen oder Organe, Gewebe oder Zellen für Transplantationen.**

Informationen für medizinisches Fachpersonal

Dieser Patient wurde mit HEMGENIX® behandelt, einem auf die Leber wirkenden Gentherapeutikum, das bei Hämophilie B die Bildung von körpereigenem Gerinnungsfaktor IX ermöglicht.

Im Fall einer ALT Erhöhung in den ersten drei Monaten nach der Behandlung mit HEMGENIX® kann eine Behandlung des Patienten mit Kortikosteroiden angezeigt sein, um das Risiko einer Leberschädigung durch HEMGENIX® zu minimieren.